



Iberogast®

Mezcla de Plantas
Solución
Oral

Medicamento
Herbolario

LEA ESTE INSTRUCTIVO CON ATENCIÓN YA QUE CONTIENE INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA EL CONSUMIDOR.

Para poder obtener buenos resultados del tratamiento, el medicamento deberá usarse con apego a la información contenida en este instructivo.

- Conserve este instructivo para que pueda leerlo nuevamente en caso de ser necesario.
- Si necesita orientación o información adicional, consulte a su médico.
- Si sus síntomas empeoran o no mejoran, consulte a su médico.

¿Qué es Iberogast® y para qué se utiliza?

Iberogast® es un medicamento a base de 9 extractos de plantas medicinales para uso en trastornos gastrointestinales. Iberogast® reduce la sensación de plenitud y distensión abdominal y alivia los cólicos estomacales e intestinales. Tiene propiedades anti-inflamatorias, antiflatulentas. Iberogast® incrementa los niveles de prostaglandinas y mucinas, las cuales protegen a la mucosa gástrica, y reduce los niveles de leucotrienos, los cuales dañan a la mucosa. Iberogast® inhibe la secreción de jugo gástrico por parte de las células parietales del estómago.

¿Qué precauciones debo considerar al tomar Iberogast®?

No utilice este medicamento si es sensible a cualquiera de los ingredientes de Iberogast®. No se recomienda su uso en niños menores de 12 años.

Es nocivo para las personas que sufren alcoholismo. Si los síntomas no mejoran después de usar el medicamento por 7 días consecutivos, consulte a su médico. Una dosis única de 20 gotas contiene solamente 0.24 g de alcohol (20 gotas equivalen a 1 mL). Este medicamento puede producir somnolencia y afectar el estado de alerta, por lo que no deberá conducir vehículos automotores ni maquinaria pesada durante su uso.

¿Puedo tomar Iberogast® en conjunto con otros medicamentos?

Hasta el momento no se tienen reportadas interacciones conocidas con otros medicamentos.

¿Puedo tomar Iberogast® durante el embarazo y lactancia?

No se administre durante el embarazo o lactancia.



¿Cómo debo tomar Iberogast®?

Iberogast® se debe agregar en una cantidad pequeña de líquido para tomarse. Puede ingerirse antes o junto con los alimentos y debe tomarse 3 veces al día, de la siguiente manera:

- Adultos y adolescentes a partir de 13 años de edad: 20 gotas
- Niños de 12 años de edad: 15 gotas
- 20 gotas equivalen a 1 mL.

Iberogast® está recomendado para su uso por periodos prolongados ya que ayuda a regular la función intestinal, sin embargo, si

persisten las molestias por más de 7 días, consulte a su médico.

¿Qué posibles efectos secundarios puedo tener al tomar Iberogast®?

Como todos los medicamentos, Iberogast® puede causar efectos secundarios, aunque éstos no se presentan en todas las personas. Con muy poca frecuencia la persona puede experimentar reacciones de hipersensibilidad tales como comezón, dificultad para respirar y reacciones en la piel. Si se presentan efectos secundarios usted deberá suspender el uso de Iberogast® y consultar a su médico.

¿Cómo debo almacenar Iberogast®?

- Consérvese a no más de 30 °C.
- Consérvese el frasco bien cerrado.
- Una vez abierto el frasco, Iberogast® puede usarse durante las siguientes 8 semanas.
- No se deje al alcance de los niños.
- Si tiene alguna duda consulte a su médico.
- Reporte las sospechas de reacción adversa al correo: farmacovigilancia@cofepris.gob.mx

Bayer de México, S.A. de C.V.
Carr. México - Toluca Km 52.5,
C.P. 52000, Lerma, México, México.

Reg. No. 004P2017 SSA VI

El logotipo de la Cruz Bayer y Bayer es marca registrada de Bayer AG, Alemania.

Para mayor información del producto comuníquese al teléfono: 800 706 03 00